

Beutalással kapcsolatos tudnivalók

FELHÍVJUK FIGYELMÉT: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 4/A. § alapján a kezelőorvosnak a beutalót az eszt útján kell kiállítania.

A társadalombiztosítás által finanszírozott vizsgálatokra kizárólag szakorvos küldhet beteget, olyan intézményből, amely a NEAK-kal szerződésben áll.

Térítéses vizsgálatra minden orvos beutalójával fogadunk beteget, így ez a lehetőség a házi orvosok és magánpraxisok előtt is nyitva áll. A DEXA vizsgálatokhoz és bizonyos típusú MR vizsgálatokhoz szakorvosi beutaló nem feltétel, de minden korábbi orvosi lelet segíti radiológus szakorvosunk munkáját.

A vizsgálatokat előjegyzett időpontokban végezzük! Emiatt arra kérjük a tisztelt kollégákat, hogy minden esetben kérjenek időpontot betegeik számára, és tájékoztassák őket arról is, hogy az akut betegek vizsgálata elsőbbséget élvez, ezért előfordulhat, hogy valamennyit várakozniuk kell.

A beteg a CT és MR vizsgálatokat követően a képi információt tartalmazó CD-t azonnal megkapja, míg a szöveges lelet kiadásának időpontjáról a recepciónkon kap tájékoztatást. A DEXA vizsgálatnál a leletet a beteg a vizsgálatot követően kézhez kapja.

A pontos diagnózis felállításához elengedhetetlen a kórelőzményi adatok ismerete. Azzal is segíti munkánkat, hogy a CT és MR vizsgálati beutalót vagy a DEXA vizsgálat beutalóját gondosan tölti ki.

A térítéses és OEP finanszírozott vizsgálatokat azonos protokoll szerint végezzük, ami mindenben megfelel a hazai és nemzetközi előírásoknak. Az ionizáló sugárzással járó vizsgálat (CT) kizárólag (szak)orvosi beutalóval vehető igénybe.

A DEXA vizsgálat során a csontok ásványi anyag tartalmát határozzuk meg. A vizsgálat egyszerű, röntgensugárzást használó eljárással történik, eredményeként megtudjuk, van-e csonttrikulása a betegnek.

Az államilag finanszírozott vizsgálatához szakorvosi beutaló szükséges. Reumatológus, belgyógyász, gasztroenterológus, endokrinológus, traumatológus, ortopédus, nőgyógyász, onkológus adhat beutalót. A jelenlegi szabályok szerint háziorvosi beutalóval a vizsgálatot nem tudjuk elvégezni a NEAK finanszírozás terhére. A szakorvosi beutalóval két régió vizsgálható. Ez minden esetben az ágyéki gerinc szakasz 4 db csigolyája és a jobb, vagy a bal oldali csípő.

Mikor indokolt a DEXA vizsgálat?

- Minden 65 évnél idősebb nőnél
- 65 éves kor előtt is, ha
 - Ha korábban porotikus törést szenvedett
 - Jelentős rizikó tényezők vannak, pl anyai ágon kis traumára csípőtáji törés lépett fel, vagy jelentékeny baleset után törés van a kórelőzményben
- hypogonadismus esetén bármely életkorban
- csigolyaabnormalitások és/vagy röntgenvizsgálat során felvetődő osteopenia tisztázására
- a testmagasság 3 cm-t meghaladó csökkenése vagy fokozódó kyphosis esetén bármely életkorban
- tartós glükokortikoid-kezelés esetén bármely életkorban
- primer hyperparathyreosisban bármely életkorban
- kétoldali/recidiváló vesekőbetegségben (kalciumkő esetén) bármely életkorban
- ismert osteoporosisal járó krónikus betegségekben
- tartós immobilizáció esetén bármely életkorban
- monitorozáshoz, illetve a monitorozás kiindulási értékének megállapítására

Menopauza előtt álló nők DEXA vizsgálata

- kis traumára bekövetkezett csonttörést követően
- ismert, csontvesztést okozó betegségekben

- csontvesztést okozó gyógyszerek tartós szedésekor (glükokortikoidok, antikonvulzív szerek, GnRh-analógok)

DEXA vizsgálat ellenjavallatai

- terhesség
- röntgen kontrasztanyag jelenléte a törzsben
- sugárzó izotóp jelenléte a törzsben