

Tájékoztató pácienseknek a CT vizsgálatról

[Tekintse meg a CT vizsgálatról készült rövid filmet!](#)

A CT vizsgálatok teljes diagnosztikus értékéhez esetenként szükséges intravénás jódtartalmú kontrasztanyag adása, amely bizonyos állapotokban, betegségeknél és gyógyszerelés mellett kockázat-növekedést okoz a betegek számára. Emiatt minden ilyen vizsgálat kérésekor, a szövődmények elkerülése érdekében minden

- vesebetegségben szenvedő,
- pajzsmirigy betegségben szenvedő,
- 70 év feletti páciens

esetében 1 hónapon belüli, vese- és pajzsmirigy funkciókat tartalmazó rutin labor vizsgálatot kérünk.

Hasi vizsgálatoknál a bélrendszer könnyebb elkülönítésére 5-10 dl kontrasztanyagot kell innia a betegnek a vizsgálat előtti órában.

Vizsgálatát nem végezhetjük el amennyiben Ön:

- várandós,
- testtömege 170 kg feletti.

Kontrasztanyag vizsgálatát nem végezhetjük el amennyiben Önnél:

- ismert kontrasztanyag allergia
- jelentős fokú vesebetegség
- kezeletlen pajzsmirigybetegség áll fenn.

A vizsgálat sikere érdekében az alábbiakat kérjük Öntől:

- Korábbi orvosi dokumentációit hozza magával.

- Amennyiben vesebetegségben szenved, kérjük, még a vizsgálat előtt konzultáljon kezelőorvosával, hogy kaphat-e jódos kontrasztanyagot és/vagy szükséges-e kontrasztanyag adás előtt bármilyen előkészület.
- Amennyiben cukorbeteg és metformin tartalmú gyógyszert szed: Kérjük, konzultáljon orvosával a gyógyszer elhagyása miatti teendőkről!

A vizsgálatot megelőzően 2 nappal, valamint azt követően még 2 napig metformin tartalmú gyógyszer elhagyása javasolt. A kontrasztanyag és a metformin együttes adásának következtében tejsavacidózis - egy súlyos-életveszélyes állapot - léphet fel. Metformint tartalmazó gyógyszerek a következők: Adimet, Avandamet, Eucreas, Gluformin, Huma-Metformin, Janumet, Maformin, Meforal, Meglucon, Merckformin, Merckformin-XR, Metfogamma, Metformin 1a Pharma, Metformin-Hexal, Metformin-BMS, Metformine-Teva, Metrivin, Metwin, Siofor, Stadamet, Velmetiam. A lista nem teljes időközben új gyógyszerek is forgalomba kerülhettek.

Amennyiben pajzsmirigybetegségben szenved, kérjük, konzultáljon kezelőorvosával, hogy kaphat-e jódos kontrasztanyagot.

A fent leírt kivételeket figyelembe véve gyógyszereit kezelőorvosa utasításai szerint a vizsgálat előtt is szedje be!

A vizsgálatot megelőző 4 órában:

- ne egyen
- kerülje a koffeintartalmú italok (kóla, kávé, tea, energital) fogyasztását
- ne dohányozzon!

A vizsgálat után bőséges folyadékfogyasztást javaslunk, hogy a kontrasztanyagot szervezete minél könnyebben ki tudja üríteni.